

معادلات المستوى		
علم ثلاثة نقاط	علم شعاعي توجيه	علم نظام ونقطة
<p>1- نشكل شعاعين $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ نعيد خطوات الحالة السابقة</p>	<p>1- ثبت أن \vec{v} غير مرتبطين 2- نفرض $(a, b, c) \vec{n}$ نظام 3- نشكل المعادلين: $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$ 4- حل المعادلين حلاً مشتركاً ثم نعطي أحد المجاهيل قيمة اختيارية غير صفرية نعرض في القانون</p>	$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$ حيث: $\vec{n}(a, b, c)$ النقطة $A(x_0, y_0, z_0)$
علم مستوى معامد ونقطتين	علم مستويين معامدين	علم مستوى موازي
<p>1- نفرض $\vec{n}(a, b, c)$ 2- نشكل شعاعاً \overrightarrow{AB} و نحدد نظام المستوى المطلوب 3- نشكل معادلين : $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ $\vec{n} \cdot \vec{n}' = 0$ نعمل كما في الحالة السابقة</p>	<p>1- نحدد النواص \vec{n}_1, \vec{n}_2 نظام 2- نفرض $(a, b, c) \vec{n}$ المستوى المطلوب 3- نشكل معادلين : $\vec{n} \cdot \vec{n}_1 = 0$ $\vec{n} \cdot \vec{n}_2 = 0$ نعمل كما في الحالات السابقة</p>	<p>1- بما أنهم متوازيان فلهم نفس الناظم نعرض في القانون</p>
مسامح بالباقي	مستوى محدد بتقاطع مستقيمين	معادلة المستوى المدورى
	<p>1- نعتبر نقطة تقاطع المستقيمين هي الناظمة المطلوبة نعتبر شعاعي توجيه المستقيم هما شعاعي توجيه المستوى</p>	<p>1- نحدد الناظمة بأنها منتصف القطعة $[AB]$ 2- نحدد الناظم بأنه الشعاع \overrightarrow{AB} نعرض في القانون</p>

التمثيل الوسيطي لمستقيم		
علم مستوى معادد	علم نقطتين	علم نقطة وشعاع توجيه
نعتبر نظام المستوى هو شعاع التوجيه و نعرض في القانون	1- نعتبر شعاع التوجيه \vec{AB} 2- نختار النقطة A أو B 3- نعرض في القانون	$\begin{cases} x = at + x_0 \\ y = bt + y_0 \\ z = ct + z_0 \end{cases} \quad t \in R$
الفصل المشترك		
1- ندرس ارتباط النواظم 2- نحل المعادلتين حلاً مشتركاً 3- نفرض أحد المجاهيل قيمة وسيطية t		
الكرة		
علم مركز ونقطة تمر منها	علم قطر	علم مركز ونصف قطر
1- يوجد نصف القطر وهو عبارة عن المسافة بين المركز والنقطة التي تمر منها الكرة. 2- نعرض في القانون السابق	1- يوجد المركز وهو منتصف قطر. 2- يوجد نصف القطر. 3- نعرض في القانون السابق	$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2$ دليلاً: المركز (x_0, y_0, z_0) نصف القطر r
كرة تمس مستوى		
1- المركز معلوم 2- نصف القطر هو $dis(\Omega, P)$ بعد مركز الكرة عن المستوى. 3- نعرض في القانون.		
الأسطوانة		
أسطوانة مدورة ox	أسطوانة مدورة oy	أسطوانة مدورة يوازي oz
$\begin{cases} (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2 = r^2 \\ x_1 \leq x \leq x_1 + h \end{cases}$ وبوجه الخصوص إذا كان مركز القاعدة هو المبدأ فتصبح المعادلة: $\begin{cases} y^2 + z^2 = r^2 \\ 0 \leq x \leq h \end{cases}$	$\begin{cases} (x - x_1)^2 + (z - z_1)^2 = r^2 \\ y_1 \leq y \leq y_1 + h \end{cases}$ وبوجه الخصوص إذا كان مركز القاعدة هو المبدأ فتصبح المعادلة: $\begin{cases} x^2 + z^2 = r^2 \\ 0 \leq y \leq h \end{cases}$	بفرض إحداثيات مركز القاعدة $A(x_1, y_1, z_1)$ وأن ارتفاع هذة الأسطوانة h ونصف قطر قاعدتها r فإن هذة الأسطوانة تُعرف بالشكل: $\begin{cases} (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r^2 \\ z_1 \leq z \leq z_1 + h \end{cases}$ وبوجه الخصوص إذا كان مركز القاعدة هو المبدأ فتصبح المعادلة: $\begin{cases} x^2 + y^2 = r^2 \\ 0 \leq z \leq h \end{cases}$

المخروط		
محور يوازي ox	محور يوازي oy	محور يوازي oz
$\begin{cases} (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2 = \frac{r^2}{h^2}(x - x_1)^2 \\ x_1 \leq x \leq x_1 + h \end{cases}$ <p>وإذا كان المركز هو المبدأ:</p> $\begin{cases} y^2 + z^2 = \frac{r^2}{h^2}x^2 \\ 0 \leq x \leq h \end{cases}$	$\begin{cases} (x - x_1)^2 + (z - z_1)^2 = \frac{r^2}{h^2}(y - y_1)^2 \\ y_1 \leq y \leq y_1 + h \end{cases}$ <p>وإذا كان المركز هو المبدأ:</p> $\begin{cases} x^2 + z^2 = \frac{r^2}{h^2}y^2 \\ 0 \leq y \leq h \end{cases}$	$\begin{cases} (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = \frac{r^2}{h^2}(z - z_1)^2 \\ z_1 \leq z \leq z_1 + h \end{cases}$ <p>وإذا كان المركز هو المبدأ:</p> $\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{r^2}{h^2}z^2 \\ 0 \leq z \leq h \end{cases}$

التمرين الأول: في كلٍ من الحالات الآتية: اكتب معادلة المستوى P :		
حيث $P = (ABC)$ المستوى P يمر من $A(3,2,2), B(0,1,0), C(1,1,1)$	2- المستوى P يمر من $A(2,3,1)$ و ناظمه الشعاع \vec{AB} حيث $B(3,2,0)$	- المستوى P يمر من $A(2,3,1)$ و ناظمه الشعاع \vec{AB}
4- المستوى P يمر من النقطتين $A(1,1,1), B(3, -1,1)$ و معادله للمستوى : $x + y + z = 1$	3- المستوى P هو المستوى المحوري للقطعة $[AB]$ حيث $A(1,1,1), B(3,2,0)$	
6- المستوى P يمر بالنقطة $A(1,1,1)$ ويواري المستوى: $Q: 2x + 3y - z = 1$	5- المستوى P معادله للمستويين: $Q: 2x + y - z - 1 = 0$ $R: x + y - 3z = 0$	- المستوى P يمر من المبدأ ويعادله المستقيم: $d: \begin{cases} x = t + 1 \\ y = 0 \\ z = -t + 1 \end{cases}; t \in \mathbb{R}$
التمرين الثاني: اكتب تمثيلاً وسيطياً للمستقيم d في الحالات الآتية:		
2- المستقيم $d = (AB)$ حيث $A(1,1,2), B(3,0,1)$	1- المستقيم d يمر من النقطة $A(-1,1,0)$ و يقبل الشعاع $(-1,2,3)$ شعاع توجيه له	
4- المستقيم d المعطى بتقاطع المستويين: $P: 2x - y + z - 2 = 0$ $Q: x + y + 2z - 1 = 0$	3- المستقيم d يمر من المبدأ ويعادله المستقيم: $x - y + z = 3$	
التمرين الثالث: اكتب معادلة الكرة S في الحالات الآتية:		
2- تقبل $[AB]$ قطرأً لها حيث $A(1,2,3), B(5,2,1)$	1- مركزها $A(1,1,3)$ وتمر من $B(0,2,2)$	
		3- مركزها $A(1,2, -1)$ و تمس المستوي $x - z = 1$

مكتبة شغف الختام - 2025 - منصة طريقي التعليمية

<p>التمرين الرابع: اكتب معادلة الأسطوانة التي محورها يوازي (oz) ومركز قاعدتها $A(1,1,3)$ وارتفاعها 5 ونصف قطر قاعدتها $\sqrt{2}$.</p>
<p>التمرين الخامس: اكتب معادلة الأسطوانة التي محورها يوازي (oy) ومركز قاعدتها السفلي $A(2,3,1)$ ومركز قاعدتها العليا $B(2,8,1)$, ونصف قطرها 3.</p>
<p>التمرين السادس: اكتب معادلة المخروط الذي محوره يوازي (ox) ومركز قاعدته المبدأ ونصف قطرها 1 وارتفاعه 3.</p>
<p>التمرين السابع: ماذا تمثل مجموعة النقاط $M(x, y, z)$ التي تحقق العلاقة: $x^2 + y^2 - z^2 = 0 ; 0 \leq z \leq 3$</p>

الوضع النسبي لمستوي مع مستوى		
شرط التعامد: جداء النواظام معدوم.	شرط التقاطع: عدم ارتباط النواظام	شرط التوازي: ارتباط النواظام وإذا كان: $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = \frac{d}{d'}$ كان المستويين منطبقين.
الوضع النسبي لمستوي مع مستقيم		
نعرض المستقيم في المستوى ونميز الحالات الآتية:		
$t = 1$ المستقيم والمستوى متقطعان في نقطة. لإيجاد احداثياتها نعرض t في المستقيم.	$0 = 1$ المستقيم يوازي المستوى	$0 = 0$ المستقيم محtoى في المستوى
الوضع النسبي لمستقيم مع مستقيم		
ندرس ارتباط اشعة التوجيه ونميز حالتين:		
الأشعة غير مرتبطة: المستقيمان غير متوازيان ، ندرس التقاطع: $x_t = x_s$ $y_t = y_s$ $z_t = z_s$		اشعة التوجيه مرتبطة: المستقيمان متوازيان

ملاحظات:

- لإثبات أن مستقيم يعمد مستوى ثابت أن النظام وشعاع التوجيه مرتبطان
- لإثبات أن شعاعاً معطى هو نظام على مستوى معلوم يوجد اسلوبين :
 - أ- الأسلوب الأول : الشعاع عمودي على شعاعين في المستوى
 - ب- الأسلوب الثاني: الشعاع المعطى مرتبط مع نظام المستوى

التمرين الأول: في كل من الحالات الآتية، ادرس تقاطع المستويين P , Q و في حال التوازي بين فيما إذا كانوا منطبقين أم لا.

$$P: 2x - y + z - 3 = 0 \\ Q: 4x - 2y + 2z - 1 = 0$$

$$P: 2x + y - z = 0, Q: x + y + z = 1$$

التمرين الثاني: ادرس الوضع النسبي للمستقيمين الآتيين:

$$d: \begin{cases} x = 3t + 1 \\ y = 4t \\ z = -t + 1 \end{cases}; t \in R \\ d': \begin{cases} x = -9s + 4 \\ y = -12s + 4 \\ z = 3s \end{cases}; s \in R$$

التمرين الثالث: d و d' مستقيمان معرفان وفق:

$$d: \begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = t \\ z = t - 1 \end{cases}; t \in R \\ d': \begin{cases} x = 3s - 4 \\ y = s - 1 \\ z = 5s - 6 \end{cases}; s \in R$$

1- أثبت أن d, d' متتقاطعان في نقطة N يتطلب تعين إحداثياتها

2- جد معادلة المستوى P المحدد بهذين المستقيمين

التمرين الرابع: ادرس الوضع النسبي للمستوى مع المستقيم المعطى:

$$d: \begin{cases} x = 2t - 2 \\ y = 0 \\ z = 4t - 7 \end{cases}; t \in R$$

$$P: 2x - y - z = 3 \quad -1$$

$$d: \begin{cases} x = t + 1 \\ y = t \\ z = t + 7 \end{cases}; t \in R$$

$$P: 2x + y - 3z - 1 = 0 \quad -2$$

المساقط القائمة							
على مستوى:	على مستوى:						
<p>1- نوجد معادلة المستوي P المعماد للمستقيم d والumar من النقطة D.</p> <p>2- نوجد نقطة تقاطع المستقيم d مع المستوي P ولتكن D' فتكون المسقط القائم للنقطة D على المستقيم d.</p>	<p>1- نوجد المعادلات الوسيطية للمستقيم d المار من D وشاع توجيهه هو \vec{n} ناظم المستوي P</p> <p>2- نوجد تقاطع هذا المستقيم مع المستوي D فنحصل على D' المسقط القائم للنقطة D على المستوى P</p>						
<p>ملاحظة: إن D' تمثل بعد النقطة D عن المستقيم.</p> <p>لا يوجد طريقة أخرى لحساب بعد نقطة ما عن المستقيم الا المسقط القائم</p>	<p>ملاحظة: إن D' تمثل بعد النقطة D عن المستوى.</p> <p>يمكن حساب بعد نقطة عن مستوى بشكل مباشر:</p> $dis(D, P) = \frac{ ax_0 + by_0 + cz_0 + d }{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$						
الوضع النسبي لمستوى مع كرة							
<p>نحسب بعد مركز الكرة عن المستوى ونميز الحالات الآتية:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>$dis > r$</th> <th>$dis = r$</th> <th>$dis < r$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>المستوى لا يشتراك مع الكرة بأي نقطة.</td> <td>المستوى يمس الكرة</td> <td>المستوى يقطع الكرة في دائرة</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nothing...keep going forward</p>		$dis > r$	$dis = r$	$dis < r$	المستوى لا يشتراك مع الكرة بأي نقطة.	المستوى يمس الكرة	المستوى يقطع الكرة في دائرة
$dis > r$	$dis = r$	$dis < r$					
المستوى لا يشتراك مع الكرة بأي نقطة.	المستوى يمس الكرة	المستوى يقطع الكرة في دائرة					
<p>يطلب حساب نصف قطر دائرة المقطع باستخدام القانون:</p> $r_c = \sqrt{r^2 - dis^2}$							

المأسولة (1)

في معلم متجانس تتأمل النقاط:
 $A(2, -2, 2), B(1, 1, 0), C(1, 0, 1), D(0, 0, 1)$

- تحقق أن النقاط (BCD) لا تقع على استقامة واحدة
- أثبت أن $z - 1 = y + z$ هي معادلة المستوي (BCD)
- أعط تمثيلاً وسيطياً للمستقيم Δ المار من A ويعمد المستوي (BCD)
- عين إحداثيات K المسقط القائم للنقطة A على المستوي (BCD)
- اكتب معادلة الكرة التي تقبل $[AD]$ قطرأً لها

المسألة (2)

في معلم متجانس تتأمل النقطة A(1,1,2) و المستويان :

$$P: x - y + 2z - 1 = 0$$

$$Q: 2x + y + z + 1 = 0$$

- أثبت أن P, Q متتقاطعان في فصل مشترك d
- اكتب تمثيلاً للمستقيم d
- اكتب معادلة المستوى R المار من A و يعادد كلاً من P, Q
- جد إحداثيات B نقطة تقاطع d مع المستوى R و استنتج وضع المستويات P, Q, R
- احسب بعد A عن المستقيم d

المسألة (3)

في معلم متجانس تتأمل النقطة A(1,2,0) و المستويات :

$$P: 2x - y + 2z - 2 = 0$$

$$Q: x + y + z - 1 = 0$$

$$R: x - z - 1 = 0$$

- أثبت أن المستويين P, Q متتقاطعان في فصل مشترك Δ . اكتب تمثيله الوسيطي
- تحقق أن المستوى R يعادد Δ ويمر من A
- أثبت تقاطع المستويات R, Q, P في نقطة I يطلب تعينها
- استنتاج بعد A عن المستقيم Δ

المسألة (4)

في معلم متجانس :

$$A(1,1,0), B(1,2,1), C(4,0,0)$$

- تتحقق ان A, B, C ليست على استقامة واحدة
- أثبت أن المستوى (ABC) تعطل بالعلاقة $x + 3y - 3z - 4 = 0$
- ليكن المستويان :

$$P: x + 2y - z - 4 = 0$$

$$Q: 2x + 3y - 2z - 5 = 0$$

أثبت أن المستويين يتتقاطعان في فصل مشترك d له التمثيل الوسيطي

$$d: \begin{cases} x = t - 2 \\ y = 3 \\ z = t \end{cases} \quad t \in R$$

- ما هي نقطة تقاطع المستويات P, Q, (ABC)
- احسب بعد A عن المستقيم d

المسألة (5)

في معلم متجانس تتأمل النقاط :

$$A(1,3,0), B(0,6,0), N(0,0,3), M(0,6,2)$$

- اكتب معادلة المستوى (AMN)
- اكتب تمثيلاً وسيطياً للمستقيم d المار من 0 وعماد المستوى (AMN)
- أثبت أن المستوى الذي معادلته $z = 1 - x$ هو المستوى المحوري للقطعة $[BM]$.

المسألة (6)

1- اكتب معادلة الكرة S التي مرکزها 0 مبدأ الإحداثيات ونصف قطرها $\sqrt{3}$.

2- تحقق ان المستوى P الذي معادلته:

$$P: x - y + z + 3 = 0$$


يمسس الكرة S .

المسألة (7)

في معلم متجانس $(\vec{k}, \vec{j}, \vec{i}; 0)$ لتكن النقطة $A(1, -2, 0)$ والمستوى $P: x + 2y + z - 1 = 0$. احسب بعد النقطة A عن المستوى P ثم اكتب معادلة الكرة التي مرکزها A وتمس المستوى P .

المسألة (8)

$ABCDEF$ متوازي سطوح فيه $\widehat{DAB} = 45^\circ$ وقياس الزاوي $BC = GC = 1$ و $AB = 2$ والنقطة I منتصف $[EF]$.



- احسب $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$
- عين موضع النقطة M التي تحقق:

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{FB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{GH}$$

المسألة (9)

في معلم متجانس $(\vec{k}, \vec{j}, \vec{i}; 0)$ تتأمل النقطتين $A(1,0,1)$ و $B(0,1,1)$.

- اكتب التمثيل الوسيطي للمستقيم d المار من A ويبلغ شعاع توجيه له $(2,2,1)$.
- أثبت أن المستقيمين (AB) و d متعامدان.

(المسألة 10)

نتأمل في معلم متباين $(0; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ النقطتين $A(2, 1, -2)$ و $B(-1, 2, 1)$ والمستوي P :

$$P: 3x - y - 3z - 8 = 0$$

- أثبت أن المستقيم (AB) يعمد المستوي P .
- اكتب تمثيلاً وسيطياً للمستقيم (AB) , ثم عين إحداثيات النقطة A' المسقط القائم للنقطة A على P .

(المسألة 11)

نتأمل في معلم متباين $(0; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ النقاط الآتية:

$$A(2, 0, 1), B(1, -2, 1), C(5, 0, 5), D(6, 2, 5)$$

- أثبت أن \vec{AC} , \vec{AB} , \vec{AD} غير مرتبطين خطياً.
- عين العددان الحقيقيين α و β بحيث:

$$\vec{AD} = \alpha \vec{AB} + \beta \vec{AC}$$

واستنتج أن النقاط D, C, B, A تقع في مستوى واحد.

(المسألة 12)

في معلم متباين $(0; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ لدينا النقطة $C(0, 0, 1)$ و $B(0, 1, 0)$ و $A(2, 0, 0)$ والمطلوب:

$$1-\text{ احسب } \cos(\widehat{BAC}) \text{ ثم استنتج } \vec{AC} \cdot \vec{AB}$$

2- إذا كانت النقطة G مركز ثقل المثلث ABC , عين مجموعة النقاط M من الفراغ التي تتحقق:

$$\left\| 2\vec{MA} + 2\vec{MB} + 2\vec{MC} \right\| = \left\| \vec{AB} \right\|$$

(المسألة 13)

في معلم متباين $(0; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ لدينا النقطتان $A(0, 1, -1)$ و $B(1, -2, 1)$ والمطلوب:

أعط معادلة للمجموعة S المكون من النقاط $M(x, y, z)$ التي تتحقق العلاقة:

$$MA = MB$$

وما طبيعة المجموعة S .


المسألة (14)

في معلم متجلانس $(\vec{k}, \vec{j}, \vec{i}; O)$ تأمل النقاطين $A(2,2,4), B(2,0,-2)$

- اكتب معادلة المستوى المحوري للقطعة المستقيمة $[AB]$.
- اعط معادلة المجموعة S المكونة من النقاط $M(x,y,z)$ التي تحقق $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$, ما طبيعة المجموعة S ؟

المسألة (15)

مكعب طول حرفه يساوي 2، تأمل المعلم المتجلانس $(\vec{k}, \vec{j}, \vec{i}; O)$ في المعلم



$$\overrightarrow{AE} = 2\vec{k} \text{ and } \overrightarrow{AD} = 2\vec{j} \text{ and } \overrightarrow{AB} = 2\vec{i}$$

- اكتب معادلة المستوى (GBD) .
- اكتب التمثيل الوسيطي للمستقيم (EC) .
- جد إحداثيات نقطة تقاطع المستقيم (EC) مع المستوى (GBD) .
- جد إحداثيات النقطة M التي تحقق العلاقة:

$$\overrightarrow{EM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{EC}$$

5- أثبت تعامد المستقيمين (EC) و (HM) .

المسألة (16)

في معلم متجلانس $(\vec{k}, \vec{j}, \vec{i}; O)$ لدينا النقاط:

$$A(1,1,0), B(1,2,1), C(4,0,0)$$

- أثبت أن النقاط A, B, C ليست على استقامة واحدة.
- أثبت أن معادلة المستوى (ABC) تعطى بالعلاقة:

$$x + 3y - 3z - 4 = 0$$
- ليكن المستويان:

$$P: x + 2y - z - 4 = 0$$

$$Q: 2x + 3y - 2z - 5 = 0$$

أثبت أن المستويين يتقاطعان في الفصل المشترك d الذي تمثله الوسيطي:

$$d: \begin{cases} x = t - 2 \\ y = 3 \\ z = t \end{cases}; t \in \mathbb{R}$$

4- ما هي نقطة تقاطع المستويات P و Q و (ABC) ؟

5- احسب بعد A عن المستقيم d .

المأسولة (17)

في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ تتأمل النقاط:

$$E(1, -1, 1), D(0, 4, 0), C(4, 0, 0)$$

$$B(1, 0, -1), A(2, 1, 3)$$

1- جد $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CE}, \overrightarrow{CD}$

2- أثبت أن النقاط C و D و E ليست واقعة على استقامة واحدة.

3- أثبت أن $(AB) \perp (CDE)$.


4- اكتب معادلة المستوى (CDE) .

5- احسب بعد B عن المستوى (CDE) .

6- اكتب معادلة الكرة التي مرکزها B وتمس المستوى (CDE) .

المأسولة (18)

تتأمل في معلم متجانس $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$ المكعب



1- اكتب في هذا المعلم إحداثيات كل من النقاط:

$$A, C, H, F, D$$

2- اكتب معادلة المستوى (ACH) .

3- أثبت أن المستوى P الذي معادلته:

$$P: -2x + 2y - 2z + 1 = 0$$

يوازي المستوى (ACH) .

4- بفرض I مركز ثقل المثلث ACH أثبت أن D و F و I على استقامة واحدة.

5- اكتب معادلة الكرة S التي مرکزها $R = \sqrt{3}(1, -1, 1)$ ونصف قطرها $\Omega = \sqrt{3}$ ويبين أن المستوى (ACH) يمس الكرة S .

المأسولة (19)

تتأمل في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ النقطة $A(1, 2, 0)$ والمستويات:

$$P: 2x - y + 2z - 2 = 0$$


$$Q: x + y + z - 1 = 0$$

$$R: x - z - 1 = 0$$

مكتبة شغف الختام - 2025 - منصة طريقي التعليمية

- أثبت أن المستويين P و Q متقاطعان مشترك Δ ، اكتب تمثيله الوسيطي.
- تحقق أن المستوى يعمد Δ ويمر بالنقطة A .
- أثبت أن المستويات R , Q , P تتقاطع بالنقطة I يطلب تعين احداثياتها.
- استنتج بعد النقطة A عن المستقيم Δ .

المسألة (20)




مكعب طول حرفه 2، نقطة تقاطع القطرين $[AG]$ و $[HB]$.

نختار معلم متجانس $(A; \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}, \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}, \frac{1}{2}\overrightarrow{AE})$. والمطلوب:

- 1- جد إحداثيات النقاط A و H و G و B و O و I .
- 2- أعط معادلة المستوى (GOB) .
- 3- احسب $\cos \widehat{GOB}$. واستنتج $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OG}$.
- 4- اكتب تمثيلاً وسيطياً للمستقيم (DC) .
- 5- أثبت أن المستقيم (DC) يوازي المستوى (GOB) .
- 6- جد الأعداد الحقيقة α و β و γ حتى تكون النقطة D مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط المثلثة (A, α) و (B, β) و (C, γ) .

المسألة (21)



في معلم متجانس $(\vec{o}; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ نتأمل النقاط:

$$A(-1, 2, 3), B(2, 1, 1), C(-3, 4, -1), D(3, 1, 1)$$

- 1- جد \overrightarrow{AC} و \overrightarrow{AB} وبين أن المستقيمين (AC) و (AB) متعمدان.
- 2- أثبت أن الشعاع (\vec{n}) يعمد المستوى (ABC) و اكتب معادلة المستوى (ABC) .
- 3- جد تمثيلاً وسيطياً للمستقيم d المار من النقطة D والعمودي على المستوى (ABC) .
- 4- احسب بعد D عن المستوى (ABC) ثم احسب دجم الهرم $D - ABC$.
- 5- بفرض G مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط المثلثة $(A, 1)$ و $(B, -1)$ و $(C, 2)$ أثبت أن المستقيمين (CG) و (AB) متوازيان.

المسألة (22)

في معلم متجانس $(\vec{o}; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ لدينا النقطة $A(1, 1, 2)$ والمستويان:

$$P: x - y + 2z - 1 = 0$$

$$Q: 2x + y + z + 1 = 0$$

مكتبة شغف الختام - 2025 - منصة طريقي التعليمية

- أثبت أن المستويين P و Q متقاطعان في فصل مشترك d .
- اكتب التمثيل الوسيطي للمستوي d .
- اكتب معادلة المستوي R المار من A المعمد للمستويين P و Q .
- جد إحداثيات B الناتجة من تقاطع المستوي R والمستقيم d .
- احسب بعد النقطة A عن المستقيم d .
- اكتب معادلة الكرة S التي مرّ بها النقطة A وتمس المستوي Q .

المسألة (23)

في معلم متباين $(0; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ تأمل النقاط:

$$D(1,1,1), C(0,0,1), B(0,1,0), A(1,0,0)$$

- جد إحداثيات G مركز ثقل المثلث ABC , وأثبت أن (OG) عمودي على المستوي (ABC) .
- جد معادلة المستوي (ABC) .

- نعرف النقاط $(2,0,0), B'(0,2,0), C'(0,0,4)$ لل المستوى $A'B'C'$. أثبت أن $0 = A'B'C'$.
معادلة المستوى $(A'B'C')$.

- أثبت أن Δ الفصل المشترك للمستويين (ABC) و $(A'B'C')$ يقبل التمثيل الوسيطي:

$$\Delta: \begin{cases} x = t \\ y = 3 - t; t \in \mathbb{R} \\ z = -2 \end{cases}$$

- احسب بعد النقطة $(1,1,1)$ عن المستقيم Δ .

جوم المجسمات الفراغية

المجسم له قاعدة واحدة	المجسم له قاعدتين
$V = \frac{1}{3}S \times h$	$V = S \times h$
حيث أن S مساحة القاعدة، h الارتفاع	
ملاحظة نظرية:	
بعد حساب الحجم يمكن استنتاج مساحة قاعدة أخرى له أو ارتفاع آخر له ويتم ذلك بحساب الحجم من منظور آخر (بدلالة القاعدة أو الارتفاع حسب الطلب)	

المجموعات النقاطية

تمثيل مستوى مدور للقطعة $[AB]$	$ \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BM} $ أو $AM = BM$
تمثيل كرة مرّ بها A ونصف قطرها $const$	$ \overrightarrow{AM} = const$ أو $AM = const$
تمثيل كرة التي قطّرها $[AB]$	$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$
تمثيل المستوى الذي يمر من النقطة A ويقبل الشعاع \overrightarrow{AB} ناظماً له	$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$

<p>تنتمم إلى مربع كامل لنصل إلى الشكل</p> $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = k$ <p>ونميز الحالات:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 $k < 0$ ف تكون معادلة تمثل المجموعة الخالية. -2 $k = 0$ ف تكون معادلة تمثل نقطة التي إحداثياتها $A(x_0, y_0, z_0)$. -3 $k > 0$ ف تكون المعادلة تمثل كرة التي نصف قطرها k ومركزها $A(x_0, y_0, z_0)$ 	<p>معادلة من الشكل:</p> $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$
<ul style="list-style-type: none"> -1 نفرض $M(x, y, z)$ -2 نعرض في المعادلة -3 نصلح ثم نقارن شكل المعادلة المختلف مع الأشكال السابقة 	<p>في باقي الحالات</p>
<p>لا ننسى الشكل العام لمعادلة المخروط والاسطوانة</p>	

تطبيقات المسافة في الفراغ		
معرفة طبيعة مثلث	انتفاء نقطة لمستوي مدوري	انتفاء نقطة لكرة
نحسب أطوال أضلاع المثلث ونقارن بينها ثم نختبر عكس فيثاغورث	نحسب بعد النقطة عن طرفي القطعة المستقيمة ونقارن بينهم	نحسب بعد النقطة عن مركز الكرة ونقارن من نصف القطر
جداء السلمي		
$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$	$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} [\vec{u} + \vec{v} ^2 - \vec{u} ^2 - \vec{v} ^2]$	$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \vec{v} \cos \alpha$
طلبات مميزة:		
<p>1- أثبتت أن النقطة J هي نقطة تلاقى الارتفاعات في المثلث ABC: $\overrightarrow{BJ} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ و $\overrightarrow{AJ} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$. ثبت أن $\cos \alpha$ عن طريق القانون الأول في الجداء السلمي.</p> <p>2- حساب $\cos \alpha$ عن طريق القانون الأول في الجدائ السلمي.</p> <p>3- اثبات أن شعاعين متساوين بالطول.</p>		


مكتبة شغف الختام - 2025 - منصة طريقي التعليمية

بنوك الأتمتة للأشعة التحليلية

1- ليكن لديك الأشعة $\vec{v} = \sqrt{2}\vec{i} + \sqrt{6}\vec{j} - \vec{k}$ ، عندئذ $||\vec{v}||$ يساوي :

10	d	7	c	9	b	3	a
----	---	---	---	---	---	---	---

2- في الشكل المجاور تتأمل متوازي مستطيلات ABCDEFGH النقطة P النقطة



المعرفة بالعلقة : تطبق على مركز الوجه

BCGF	d	ADHE	c	EFGH	b	ABCD	a
------	---	------	---	------	---	------	---

3- لدينا المعلم الكيفي $(F; \vec{FA}, \vec{FB}, \vec{FD})$ عندئذ إحداثيات N التي تحقق: $\vec{AN} = \vec{NB}$ هي:

$N\left(\frac{1}{2}, 2, 0\right)$	D	$N\left(1, \frac{1}{2}, 0\right)$	C	$N\left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$	B	$N\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$	A
-----------------------------------	---	-----------------------------------	---	---	---	---	---

4- لتكن النقط (A,1,2,-1), B(2,1,0) و C(1,2,-1) أي من المعادلات الآتية تمثل معادلة

للمستوى (ABC)

$x - 3y - 2z = 0$	d	$x - 2y - 3z + 1 = 0$	c	$x - 2y - 3 = 0$	b	$x - 2y - 3z = 0$	a
-------------------	---	-----------------------	---	------------------	---	-------------------	---

5- لتكن النقط (A,1,3,-1), B(2,5,2), C(3,4, α) أحد قيم العدد α التي يجعل المثلث ABC متساوياً

الساقين رأسه

2	d	3	c	1	b	-3	a
---	---	---	---	---	---	----	---

6- معادلة المستوى المار من النقطة A(3,-2,2) وشعاعاً توجيه $\vec{u}(1,1,0)$, $\vec{v}(-1,1,1)$

$-x + y + 1 = 0$	d	$x - y + 2z = -5$	c	$x - y + 2z - 9 = 0$	b	$3x - y + 2z = 9$	a
------------------	---	-------------------	---	----------------------	---	-------------------	---

7- المستوى المحدد بالنقط (2,0,0), (0,3,0), (0,0,5) له المعادلة :

$x + y + z = 30$	d	$15x + 10y + 6z = 1$	c	$x + y + z = 1$	b	$15x + 10y + 6z = 30$	a
------------------	---	----------------------	---	-----------------	---	-----------------------	---

8- في معلم متجانس تتأمل الشعاعين \vec{u} , \vec{v} ولنعرف الشعاعين :

$$\vec{w}_1 = 2\vec{u} - \vec{v}, \quad \vec{w}_2 = 2\vec{u} + \vec{v}$$

فإذا علمت أن \vec{w}_1 , \vec{w}_2 متعامدان يمكن إثبات أن :

$ \vec{u} = \frac{1}{2} \vec{v} $	d	$ \vec{u} = 2 \vec{v} $	c	\vec{u}, \vec{v} مرتبان خطياً	b	\vec{u}, \vec{v} لهما الطول ذاته	a
--	---	------------------------------	---	------------------------------------	---	---------------------------------------	---

9- لتكن لدينا النقط (A,1,2,-3), B(-1,3,3), C(4,-1,2) فإن إحداثيات D التي يجعل ABCD متوازي الأضلاع

هي :

D(6,-2,-4)	d	D(-2,0,-8)	c	D(2,0,8)	b	D(6,-2,4)	a
------------	---	------------	---	----------	---	-----------	---

10- بفرض A, M نقطتان من الفراغ وتحقق أن $AM^2 = 3 + (x+1)^2$ عندئذ أصغر قيمة لـ

$\sqrt{3}$	d	3	c	-1	b	1	a
------------	---	---	---	----	---	---	---

11- قيمة العدد الحقيقي m التي تجعل الأشعة $\vec{w}(-4, m, -2)$, $\vec{u}(1, 0, 2)$, $\vec{v}(-1, 2, 0)$ مرتبطة خطياً

1	d	-3	c	6	b	3	a
---	---	----	---	---	---	---	---

مكتبة شغف الختام - 2025 - منصة طريقي التعليمية

12- معادلة المستوى P المار من النقطة $A(0,1,0)$ و $\vec{v}(0,3,-1)$ شعاعي توجيه:

$y - z + 1 = 0$	d	$y = 1$	c	$z = 2$	b	$x = 0$	a
-----------------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----

13- قيمة العدد الحقيقي λ التي يجعل المستوىان :

$$P: x + 2y - \lambda z + 1 = 0$$

$$Q: (3\lambda - 7)x + 4y - 6z + 5 = 0$$

لا يمكن تعينها	d	2	c	-3	b	3	a
----------------	-----	---	-----	----	-----	---	-----

14- قيمة العدد λ الذي يجعل المستويين متعمدين :

$$2x + 3y - 4z + 1 = 0$$

$$\lambda x + 2y + \frac{\lambda}{2}z - 3 = 0$$

غير موجودة	d	2	c	-3	b	3	a
------------	-----	---	-----	----	-----	---	-----

15- إذا علمت أن نظام \vec{u} يساوي 5 ونظيم \vec{v} يساوي 3 وان $-\vec{v} + 2\vec{u}$ المقدار يساوي:


143	d	-166	c	140	b	134	a
-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----

16- مار من $P(2,5,-2)$ وعمودي على كل من Q و R وحيث:

$$\begin{cases} Q: x - 2y + 3z - 5 = 0 \\ R: x + y + z + 1 = 0 \end{cases}$$

$P: -10x - y - z - 2 = 0$	b	$P: -10x + 4y + 6z + 12 = 0$	a
$P: x + y + z + 1 = 0$	d	$P: 10x + 4y - 6z + 12 = 0$	c

17- في الشكل المجاور. متوازي مستطيلات ABCDEFGH فيه



وفرض J منتصف $[CG]$ عند \vec{CG} قيمة الجداء

: هي $\vec{JD} \cdot \vec{JH}$

3	d	12	c	15	b	16	a
---	-----	----	-----	----	-----	----	-----

18- نفترض أن $\vec{AM} = \frac{1}{2}\vec{BC} + \frac{3}{4}\vec{BD}$ و النقاط B, C, D ليست على استقامة واحدة \vec{AM} يمكن التأكيد على أن

المسقطين (BCD) (AM) يوازي المستوى	b	النقاط A, M, B على استقامة واحدة	a
$P: x + y + z + 1 = 0$	d	المسقط (AM) يوازي أحد المستقطفين $(BC), (BD)$	c

19- نفترض أن $\vec{AB} \cdot \vec{BM} = 1$ و نفترض أن I منتصف $[AB]$ عند \vec{AB} أي من العلاقات الآتية صحيحة

$IA^2 = \frac{1}{2}IM^2$	d	$IA^2 = IM^2$	c	$IA^2 = 1 + IM^2$	b	$IM^2 = 1 + IA^2$	a
--------------------------	-----	---------------	-----	-------------------	-----	-------------------	-----

20- أكمل العبارة الآتية: أغان الله المدرسين الذين ...

يمسحون السبورة بأنفسهم	b	لا يملكون أقلاماً ملونة	a
يدرسوننا	d	لا يملكون طلاب مثلكم	c

مكتبة شغف الختام - 2025 - منصة طريقي التعليمية

21- في معلم متجانس . تتأمل النقطة A(3,4,1) و لتكن B مسقط C على المستوى xoz و النقطة مسقط

على محور الرواقم . عندئذ طول القطعة المستقيمة [AC]

$\sqrt{3}$	d	2	c	$\sqrt{5}$	b	5	a
------------	-----	---	-----	------------	-----	---	-----

22- إذا كان d هو الفصل المشترك للمستويين :

$$P: x - 2y + 3z = 5 , Q: x + y + z = -1$$

عندئذ d هو مجموعه النقاط

$\left(-\frac{5}{3}z + 1, \frac{2}{3}z - 2, 3z\right)$	d	$(-5z + 1, \frac{2}{3}z - 2, z)$	c	$(-\frac{5}{3}z + 1, \frac{2}{3}z - 2, z)$	b	$(-5z + \frac{1}{3}, 2z - \frac{2}{3}, 3z)$	a
--	-----	----------------------------------	-----	--	-----	---	-----

23- المستويان $2x + 2y + 2z = 0 , x + y - 4z = 0$

متقاطعان دون تعاون	d	متقاطعان و متعاددان	c	طريقان	b	متوازيان دون تطابق	a
--------------------	-----	---------------------	-----	--------	-----	--------------------	-----

24- في معلم متجانس لتكن النقطتان $M(x, y, z)$. النقطة $A(1,2,-1), B(3,0,1)$. تتنبئ إلى المستوى المحوري

للقطعة [AB] إذا وفقط إذا كان $x + my + nz - 1 = 0$ عندئذ

$m = 1$	d	$m = n = 1$	c	$m = 0$	b	$m = -1$	a
---------	-----	-------------	-----	---------	-----	----------	-----

25- الكروة S مركزها A و نصف قطرها 3 . و المستوى P يقطعها في دائرة نصف قطرها $\sqrt{2}$. قيمة

يساوي

2	d	$\sqrt{2}$	c	$\sqrt{11}$	b	$\sqrt{7}$	a
---	-----	------------	-----	-------------	-----	------------	-----

26- في معلم متجانس . لتكن النقط A(1,0,0), B(0,1,0), C(0,0,1), E(1,1,1) . متوسط [BA] عندئذ

قيمة $\cos(\vec{CM}, \vec{OE})$ هي

0	d	-1	c	1	b	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	a
---	-----	----	-----	---	-----	----------------------	-----

27- لدينا ABCD رباعي وجوم . M تتنبئ إلىحرف [AB] و N تتنبئ إلىحرف [AC] . مركز الأبعاد المتناسبة

للنقط (A, α), (B, 1), (C, 1), (D, 1) عندئذ قيمة العدد α

3	d	2	c	1	b	$\frac{3}{2}$	a
---	-----	---	-----	---	-----	---------------	-----

28- تتأمل النقطتين A(-1,2,3), B(1,4, -5) . معادلة الكروة التي مركزها A و تمثى المستوى المحوري

[AB]

$x^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 18$	b	$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 72$	a
$(x + 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 3)^2 = 36$	d	$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 18$	c

29- ليكن d المستقيم الذي يعطى وسيطياً بالمعادلات $x = t + 1, y = t - 2, z = 3t$ حيث $t \in \mathbb{R}$. و المستوى

P: $2x + ay - z + b = 0$ فإن قيمة الثانوية (a, b) فـإذا علمت أن المستقيم d محتوى في المستوى P

(1,0)	d	(-1, -4)	c	(-1,4)	b	(0,1)	a
-------	-----	----------	-----	--------	-----	-------	-----

مكتبة شغف الختام - 2025 - منصة طريقي التعليمية

30- في معلم متباين لديك النقاط $A(3,2,1), B(1,2,0), C(3,1,-2)$. العلاقة بين x, y, z لتكون النقاط

في مستوى واحد $A, B, C, D(x, y, z)$

$-x + 6y - 13 = 0$	<i>d</i>	$x + 6y + 5 = 0$	<i>c</i>	$x + 6y - 11 = 0$	<i>b</i>	$x + 6y - 19 = 0$	<i>a</i>
--------------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------

31- بفرض G مركز ثقل المثلث ABC . إن مجموعة النقاط $M(x, y, z)$ التي تحقق :

$$\left\| 2\vec{MA} + 2\vec{MB} + 2\vec{MC} \right\| = 6 \left\| \vec{AB} \right\|$$

كرة مركزها G ونصف قطرها 6	<i>b</i>	كرة مركزها G طول نصف قطرها	<i>a</i>
غير ذلك	<i>d</i>	المستوى المحوري للقطعة $[AB]$	<i>c</i>

32- راعي وجود G مركز ثقل المثلث (ABC) مجموعة النقاط $M(x, y, z)$ التي تتحقق

$$\left\| \vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} \right\| = \left\| 3\vec{MD} - \vec{MA} - \vec{MB} - \vec{MC} \right\|$$

كرة مركزها G ونصف قطرها	<i>b</i>	كرة مركزها G طول نصف قطرها	<i>a</i>
غير ذلك	<i>d</i>	المستوى المحوري للقطعة $[AB]$	<i>c</i>

33- مجموعة النقاط $M(x, y, z)$ المحققة للشرط :

$$x^2 + z^2 - \frac{9}{4}y^2 = 0, \quad 0 \leq y \leq 4$$

محروط دواراني محوره محور الترايب ونصف قطر قاعدته 6	<i>b</i>	أسطوانة محورها محور الترايب	<i>a</i>
محروط دواراني محور محور الترايب ونصف قطر قاعدته 3	<i>d</i>	محروط دواراني محوره محور الفواصل ونصف قطر قاعدتها 3	<i>c</i>

34- في معلم متباين (ABC) إن معادلة المستوى

$x + y + z = 0$	<i>b</i>	$x + y + z - 1 = 0$	<i>a</i>
$x - y - z = 0$	<i>d</i>	$x + y + z + 1 = 0$	<i>c</i>

35- المستوىان $P_1: 2x + y - z + 2 = 0$, $P_2: x + 2y - z + 1 = 0$ متقاطعان بمستقيم تمثله مجموعة

الداول :

$(x, 3x, x - 1): x \in R$	<i>b</i>	$(5, 2z, z): z \in R$	<i>a</i>
$(y - 1, y, 3y) : y \in R$	<i>d</i>	$(y + 1, y, 5y) : y \in R$	<i>c</i>

36- لتكن النقطتان $B(1,2,-1)$ و $A(-1,2,3)$ فإن إحداثيات نقطة تقاطع المستقيمي $x + y + z = 1$

مع المستوى P (AB)

$I(2,2,-3)$	<i>d</i>	$I(-2,-2,3)$	<i>c</i>	$I(3,2,2)$	<i>b</i>	$I(3,-2,2)$	<i>a</i>
-------------	----------	--------------	----------	------------	----------	-------------	----------

37- في معلم متباين تتأمل النقطة $C(0,0,1)$ فإن قيمة $\cos(\widehat{BAC})$

$-\frac{2}{5}$	<i>d</i>	$\frac{2}{5}$	<i>c</i>	$-\frac{4}{5}$	<i>b</i>	$\frac{4}{5}$	<i>a</i>
----------------	----------	---------------	----------	----------------	----------	---------------	----------

38- مجموعة النقاط $M(x, y, z)$ التي تتحقق المعادلة $x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 8 = 0$ تتمثل

كرة نصف قطرها 9	<i>d</i>	كرة نصف قطرها 3	<i>c</i>	المجموعة الداخلية	<i>b</i>	نقطة وحيدة	<i>a</i>
-----------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	------------	----------

مكتبة شغف الختام - 2025 - منصة طريقي التعليمية

39- لدينا $\triangle ABC$ مثلث قائم في A و متساوي الساقين . طول كل من ساقيه $\sqrt{2}$ قيمة الجداء السلمي $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$

تساوي

$\sqrt{2}$	d	$-\sqrt{2}$	c	2	b	-2	a
------------	-----	-------------	-----	---	-----	----	-----

عندئذ يساوي الشعاع [FG] مترافق I . مترافق ABCDEFGH -40

$$\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{HJ}$$

يساوي

\overrightarrow{AJ}	d	\overrightarrow{AG}	c	$(AH)^\rightarrow$	b	\overrightarrow{AD}	a
-----------------------	-----	-----------------------	-----	--------------------	-----	-----------------------	-----

معادلة المستوى المعامد لمستقيم d معادلته الوسيطية -41

$$x = 0, y = -t, z = -t + 1$$

$y - z + 3 = 0$	d	$x + y + 3 = 0$	c	$y - z - 3 = 0$	b	$z + y - 3 = 0$	a
-----------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----

: 42- المستقيم d المعروف وسيطياً وفق :

$$d: \begin{cases} x = at - 1 \\ y = 3t + 2 \\ z = 2t \end{cases}$$

قيمة العدد a لتنتمي النقطة A(-2,5,2) للمستقيم

1	d	-1	c	-2	b	0	a
---	-----	----	-----	----	-----	---	-----

: 43- في معلم متباين :

$$d: \begin{cases} x = 3t + 1 \\ y = 2t \\ z = -t + 1 \end{cases}; t \in R \quad , \Delta: \begin{cases} x = s + 2 \\ y = 1 \\ z = 3s + 1 \end{cases}; s \in R$$

متخالفان متعامدان	d	متوازيان دون انطباق	c	متقاطعان دون تعامد	b	منطبقان	a
----------------------	-----	------------------------	-----	-----------------------	-----	---------	-----

44- لدينا النقاط C(1,5,5), B(0,0,1), A(1,2,0) . إن إحداثيات النقطة D مسقط (-11,9,-4) على المستوى

(ABC)

(2,4, -1)	d	(1,2,4)	c	(-4,2,1)	b	(-2, -4,1)	a
-----------	-----	---------	-----	----------	-----	------------	-----

: 45- إحداثيات النقطة E من مدور الترايبي و متساوية البعد عن النقطتين B(2,1,0), A(2,0,2) هي :

$\left(0, -\frac{3}{2}, 0\right)$	d	$\left(0, \frac{3}{2}, 0\right)$	c	(0, -2,0)	b	(0,2,0)	a
-----------------------------------	-----	----------------------------------	-----	-----------	-----	---------	-----

46- في معلم متباين لدينا النقاط A(2,0,0), B(0,3,0), C(0,0,1) . بعد المبدأ عن المستوى (ABC) يساوي

$\frac{36}{49}$	d	$\frac{1}{36}$	c	$\frac{6}{7}$	b	$\frac{7}{6}$	a
-----------------	-----	----------------	-----	---------------	-----	---------------	-----

47- ليكن المستوى $P: 2x - 2y + az + 3 = 0$

و ليكن المستقيم :

$$x = 1 + t, y = 2 - t, z = 3 + 2t$$

قيمة الثابت a الذي يجعل المستقيم السابق يوازي المستوى P

2	d	-2	c	-1	b	-4	a
---	-----	----	-----	----	-----	----	-----

48- في معلم متباين تألف النقاط M(3,3,3) و المستويان :

$$P: 2x + y + 2z - 6 = 0$$

$$Q: 2x - 2y - z + 6 = 0$$

متعامدان . بعد النقطة M عن الفصل المشترك لهما يساوي

$\sqrt{5}$	d	$2\sqrt{5}$	c	$\sqrt{10}$	b	2	a
------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	---	-----

مكتبة شغف الختام - 2025 - منصة طريقي التعليمية

: نقطة تحقق M رباعي وجوم و $ABCD$ -49

$$\overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{DB})$$

M منطبق على $[AC]$	d	M منطبق على $[AB]$	c	M منطبق على C	b	M منطبق على A	a
----------------------	-----	----------------------	-----	-------------------	-----	-------------------	-----

-50- إن قيمة العددين x, y المحققان العلاقة $\vec{AM} = x\vec{AB} + y\vec{AC}$ لتكون M مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط $(A, 3), (B, 1), (C, 2)$

$x = -\frac{2}{3}, y = -\frac{2}{3}$	d	$y = \frac{1}{3}, x = \frac{1}{6}$	c	$x = \frac{1}{3}, y = \frac{1}{6}$	b	$x = \frac{1}{6}, y = -\frac{1}{3}$	a
--------------------------------------	-----	------------------------------------	-----	------------------------------------	-----	-------------------------------------	-----

-51- ليكن $ABCD$ رباعي وجوم و ليكن I مركز ثقل المثلث BCD . و النقطة K نظيره A بالنسبة لـ I . فإن K مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط

$(A, -3)$ $(B, -2)$ $(D, -2)$ $(C, -2)$	d	$(A, -3)$ $(B, 2)$ $(D, 2)$ $(C, 2)$	c	$(A, -3)$ $(B, -2)$ $(D, 2)$ $(C, 2)$	b	$(A, -3)$ $(B, 2)$ $(D, 2)$ $(C, -2)$	a
--	-----	---	-----	--	-----	--	-----

-52- رباعي وجوم I مركز ثقل المثلث ABC , H مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط المثلثة

$(D, \alpha), (C, 1), (B, 1), (A, 1)$

قيمة α التي تجعل H منتصف $[DI]$ هي:

-2	d	3	c	2	b	1	a
----	-----	---	-----	---	-----	---	-----

-53- المستويان P, Q معادلتاهما $Q: x - y = 1, P: x + 2y = 4$ عندئذ التمثيل الوسيطي للفصل المشترك

لهمما:

$\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \quad t \in \mathbb{R} \\ z = t \end{cases}$	d	$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \quad t \in \mathbb{R} \\ z = t \end{cases}$	c	$\begin{cases} x = t \\ y = 2t \quad t \in \mathbb{R} \\ z = t \end{cases}$	b	$\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \\ z = 0 \end{cases}$	a
--	-----	--	-----	---	-----	---	-----

-54- المعادلات الثلاث $P_1: x + 2y + z = 5, P_2: 2x - y = 1, P_3: 3x + y = 4$ تمثل ثلاثة مستويات:

متعمدة	d	متقاطعة بفصل مشترك	c	متقاطعة بنقطة واحدة	b	متوازية	a
--------	-----	--------------------	-----	---------------------	-----	---------	-----

-55- نقطتان مختلفتان في الفراغ، عندئذ مجموعة نقاط الفراغ M التي تتحقق $MA = 4MB$ هي:

كرة	e	مستقيم	d	المستوى $[AB]$ المدور حول IJ	c	نقطة وحيدة	a
-----	-----	--------	-----	--------------------------------	-----	------------	-----

-56- معادلة للمستوى المدور للقطعة المستقيمة $[IJ]$ حيث $I(2, 0, 1), J(1, 2, 0)$ ، عندئذ:

إحداثيات J هي:

$(3, 4, 1)$	e	$(1, 1, 2)$	d	$(1, 2, 3)$	c	$(0, -2, 3)$	b	$(0, 2, -1)$	a
-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	--------------	-----	--------------	-----

مكتبة شغف الختام - 2025 - منصة طريقي التعليمية

57- تتأمل ثلاثة نقاط A, B, C من الفراغ وعددًا حقيقيًا α من المجال $[-1, +1]$ نرمز بالرمز G_α إلى مركز الأبعاد

المتناسبة للنقاط $(C, -\alpha), (B, 1 + \alpha^2), (A, \alpha)$ تساوي:

$\frac{1 + \alpha^2}{\alpha} \overrightarrow{AC}$	e	$\frac{\alpha - 1}{1 + \alpha^2} \overrightarrow{AC}$	d	$\frac{1 - \alpha}{1 + \alpha^2} \overrightarrow{AC}$	c	$\frac{\alpha}{1 + \alpha^2} \overrightarrow{AC}$	b	$-\frac{\alpha}{1 + \alpha^2} \overrightarrow{AC}$	a
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---

58- ليكن لدينا الكرة S التي مركزها $(1, 0, 1)$ ونصف قطرها R والمستوى $P: 2x + y - 2z = 12$

إذا كان تقاطع S و P هو دائرة نصف قطرها $r = 3$ ، إن R يساوي:

$3\sqrt{2}$	d	3	c	5	b	$2\sqrt{3}$	a
-------------	---	---	---	---	---	-------------	---

59- المستقيمان L و L' معرفان وسيطياً وفق الآتي $L' \begin{cases} x = t + 1 \\ y = 1 \\ z = t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ $L \begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda - 1 \\ z = 1 \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$

إن إحداثيات نقطة تقاطع المستقيمين L, L' هي:

(2,1,1)	d	(-1,-1,2)	c	(1,1,2)	b	(2,-1,1)	a
---------	---	-----------	---	---------	---	----------	---

60- متوازي أضلاع عند M هي مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط:

$(A; -1), (B; 1)$ $(C; 2)$	d	$(A; 1), (B; -1)$ $, (C; 1)$	c	$(A; -1), (B; 1)$ $, (C; 1)$	b	$(A; 1), (B; 1)$ $, (C; -1)$	a
-------------------------------	---	---------------------------------	---	---------------------------------	---	---------------------------------	---

61- في معلم متجانس للفراغ، ليكن $A(1,2,1)$ والممثل (d) المماثل وسيطياً وفق:

عند $x = 0, y = -t, z = -t + 1 : t \in \mathbb{R}$ عند $x = 0, y = -t, z = -t + 1 : t \in \mathbb{R}$ معادلة المستوى المار بالنقطة A وبعامد (d) هي:

$x + 3 = 0$	e	$y - z + 3 = 0$	d	$x + y + 3 = 0$	c	$y - z - 3 = 0$	b	$z + y - 3 = 0$	a
-------------	---	-----------------	---	-----------------	---	-----------------	---	-----------------	---

62- في معلم متجانس $(0; i, j, k)$. معادلات ثلاثة مستويات، بحل الجملة الخطية الموافقة فإن هذه

المستويات:

$$P_1: x + y + z = 1$$

$$P_2: -2y + z = 1$$

$$P_3: -4y + 14z = -2$$

متعامدة	e	تشترك بنقطة	d	لا تشترك بأية نقطة	c	تشترك بمستقيم	b	متوازية	a
---------	---	-------------	---	--------------------	---	---------------	---	---------	---

63- تتأمل في معلم متجانس $(0; i, j, k)$ ، المستويين $\begin{cases} x - y + 1 = 0 \\ x + y - 1 = 0 \end{cases}$ فإن التمثيلات الوسيطية

لفرضها المشترك بدلالة $t \in \mathbb{R}$ هو:

$\begin{cases} x = 0 \\ y = 2 \\ z = t \end{cases}$	e	$\begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \\ z = t \end{cases}$	d	$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = -t \end{cases}$	c	$\begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = 1 \end{cases}$	b	$\begin{cases} x = -t \\ y = 2 \\ z = 0 \end{cases}$	a
---	---	---	---	--	---	---	---	--	---

64- إذا علمت أن نظام \vec{u} يساوي 5 ونظم \vec{v} يساوي 3 وأن $-5\vec{u} - 3\vec{v} = \vec{w}$ فإن \vec{w} يساوي:

3	e	5	d	2	c	8	b	4	a
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

65- مكعب $ABCDEFGH$ عند $D; \frac{1}{2}\overrightarrow{DA}, \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}, \frac{1}{2}\overrightarrow{DH}$ نعرف علىه معلماً . عند B معادلة مجموع نقطة

الفراغ التي تنتج عن دوران الظاهر $[BF]$ من المستطيل $BFHD$ حول (DH)

$x^2 + y^2 = 2$, $0 \leq z \leq 2$	b	$x^2 + y^2 = 8$, $0 \leq z \leq 2$	a
$x^2 + y^2 = 2$, $0 \leq z \leq 1$	d	$x^2 + y^2 - 2z^2 = 0$, $0 \leq z \leq 2$	c

مكتبة شغف الختام - 2025 - منصة طريقي التعليمية

66- بفرض B نقطتان متعارزان في الفراغ ، في الخيارات الآتية نضع توصيفاً لمجموعة النقاط M المحددة للشرط المذكور

$MB = AB$ كرة مركزها B و نصف قطرها	b	$MA = MB$ المستوى المحوري للقطعة $[AB]$	a
$\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{AB}$ نقطة وحيدة	d	$\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MB}$ تمثل نقطة وحيدة هي منتصف القطعة $[AB]$	c

67- أكمل العبارة الآتية : أuan الله المدرسين الذين ...

يسعدون السبورة بأنفسهم	b	لا يملكون أقلاماً ملائمة	a
يدرسوننا	d	لا يملكون طلاب مثلهم	c

